

Mapeando os ossos temporais para o implante coclear

FATORES IMPEDITIVOS:

- **Aplasia labiríntica completa ou coclear isolada**
- **Otocisto rudimentar**
- **Esclerose coclear**
- **Ausência/alteração do nervo coclear**


FATORES QUE DIFICULTAM:

- **Malformação da cavidade comum**
- **Hipoplasia coclear**
- **Partição incompleta**
- **Síndrome do aqueduto vestibular alargado**
- **Posição anormal do nervo facial**
- **Janelas redonda e oval hipoplásicas**
- **Anormalidades da abertura coclear**
- **Fibrose cochlear**
- **Otosclerose**
- **Colesteatoma**
- **Otite média crônica**
- **Labirintite ossificante**
- **Neurinomas (Schwannomas)**

Mapeando os ossos temporais para o implante coclear

O que o radiologista deve destacar?


Calibres das espiras basais das cócleas



Mapeando os ossos temporais para o implante coclear

O que o radiologista deve destacar?


Amplitude das aberturas cocleares



Mapeando os ossos temporais para o implante coclear

O que o radiologista deve destacar?


Posição dos seios sigmóides em relação ao contorno posterior das mastoides



Mapeando os ossos temporais para o implante coclear

O que o radiologista deve destacar?

Distâncias dos eixos longitudinais das cócleas



Reformatação no plano de Stenvers