





Manifestação Aguda de Carcinoma
Espinocefalular Localmente Avançado no
Seio Maxilar com Envolvimento da
Hemiface Direita: Relato de Caso



Tomografia computadorizada de face de entrada evidenciando lesão heterogênea, expansiva e infiltrativa, centrada no seio maxilar direito, apresentando realce difuso e heterogêneo ao meio de contraste endovenoso, adquirindo aspecto "cerebriforme", delimitando áreas centrais de necrose / liquefação, promovendo erosão com expansão das paredes do seio maxilar, abaulando a hemiface direita, medindo cerca de 8,7 x 6,4 x 4,4 cm, com características de imagem inespecíficas.


A e B- Corte axial ;
C e D- Corte coronal.



A




B




C



D




E



F

Ressonância Magnética de entrada exibindo massa heterogênea, expansiva e infiltrativa, centrada no seio maxilar direito, apresentando realce difuso e heterogêneo ao meio de contraste endovenoso, delimitando diversas áreas centrais de necrose / liquefação, promovendo erosão com expansão das paredes do seio maxilar, abaulando a hemiface direita, promovendo erosão e esclerose das paredes laterais da órbita, assim como de parte do arco zigomático, infiltrando o espaço mastigatório, envolvendo notadamente o aspecto anterior do músculo masseter, sem planos de clivagem definidos com o mesmo.

- A- Corte axial em T2;
- B- Corte coronal em T2;
- C- Corte axial em T1;
- D - Corte coronal em T1 fastsat;
- E- Corte axial em SWI;
- F- Corte axial em difusão B1000;



Tomografia computadorizada de face evidenciando remissão expressiva da lesão previamente apresentada.

A- Corte axial ; B- Corte coronal.